Société Tunisienne d'hématologie

الجمعية المغربية لأمراض الدم
Société Marocaine d'Hématologie

Société Algérienne d'hématologie et de Transfusion Sanguine

XX^{ème} Congrès Maghrébin & National d'Hématologie

Caractéristiques Épidémiologiques du Lymphome de Burkitt

Saidi.G[1], Cherni.R[1] , Kefi.S[1], Rakkaz.O[1], Achour.M[1], [1], Ben Neji.H[1], Ben Lakhal.R[1]
[1]: Service hématologie clinique adulte, Hôpital Aziza Othmana Tunis

Introduction

Le lymphome de Burkitt est un lymphome non hodgkinien de phénotype B très agressif. Il s'agit d'une entité rare qui peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. L'objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques épidémiologiques des patients atteints de lymphome de Burkitt suivis dans notre centre.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective menée au service d'hématologie clinique Adulte de l'Hôpital Aziza Othmana de Tunis entre janvier 2015 et décembre 2022. Elle a inclus 14 patients âgés de plus que 18 ans atteints d'un lymphome de Burkitt et traités au sein de notre centre.

Résultats

L'âge médian des patients était de 40 ans [18 à 70].
Une prédominance masculine a été notée soit un gender ratio à 1,8.



Aucun patient n'avait d'antécédents particuliers notamment pas d'infection au virus d'immuno-déficience humaine (VIH).

Sur le plan clinique, 6 parmi les 14 patients (43%) avaient des signes généraux.
Des douleurs abdominales ont été rapportées dans la moitié des cas.
Un syndrome tumoral a été retrouvé chez 7 malades (50%)

Le diagnostic a été posé sur une adénectomie chez 6 patients, sur une biopsie ostéo-médullaire dans 3 cas et sur une biopsie d'une masse digestive dans 5 cas.



L'étude cytogénétique a révélé la présence de la translocation (8;14) chez 6 /14.

Une atteinte neuro-méningée a été identifiée chez 2 patients.
Pour la stadification, 3 patients étaient classés en stade III et 11 patients étaient classés en stade IV selon la classification de Murphy.



Conclusion

Le lymphome de Burkitt est un lymphome très agressif qui nécessite un diagnostic rapide et une prise en charge en urgence.
Au moment du diagnostic, la majorité des patients avait une maladie de stade étendu témoignant de l'agressivité de cette hémopathie.
L'atteinte ostéo-médullaire et l'atteinte méningée, ayant un impact pronostique important, doivent être recherchées systématiquement pour la stratification du groupe de risque nécessaire aux choix thérapeutiques.