

XX^{ème} Congrès Maghrébin & National d'Hématologie Tanger 2024

Toxicité hématologique de la chimiothérapie dans le lymphome de Hodgkin de l'adulte


Abid A¹, Sayadi.M¹, Mansouri.R¹, Miled.W¹, Ben Lakhal.R¹, Jabr.D¹ Kacem.K¹
1:Service Hématologie Clinique Adulte, Hôpital Aziza Othmana, Tunis

Introduction :

Le lymphome de Hodgkin(LH) est une hémopathie lymphoïde B affectant l'adulte jeune. La chimiothérapie systémique est le traitement de référence des stades étendus.

La toxicité hématologique de la chimiothérapie dans le traitement du lymphome de Hodgkin au stade avancé représente un problème majeur qui peut compromettre la qualité de vie du patient. Notre objectif était de décrire les effets secondaires d'ordre hématologique durant les cycles de chimiothérapie.

toxicité hématologique : cures BEACOPP (478 cycles)




Matériels et méthodes

Étude descriptive rétrospective, monocentrique incluant les patients ayant un âge entre 18 et 60 ans suivis pour un LH au service.

d'Hématologie Clinique Aziza Othmana à Tunis, entre janvier 2016 et décembre 2023. Nous avons inclus les patients en stade étendu ou en stade localisé avec gros médiastin traités selon le protocole MDH 2015.

neutropénie fébrile : cures BEACOPP (478 cycles)



Résultats

Nous avons colligé 146 patients suivis pour un LH en stade étendu.

Le nombre total de cycles BEACOPP était de 478 . Nous avons noté une anémie de grade ≥ 3 dans 15,27% et par une thrombopénie ≥ 3 dans 20,5% avec recours à des transfusions par des CGR ou des CSP dans 9% des cycles.

On a constaté une neutropénie de grade ≥ 3 dans 47,2% , épisode de neutropénie fébrile dans 34,9% des cycles avec 8% de décès.

Une désescalade vers un niveau inférieur de la cure BEACOPP est faite dans 14% des cas.

Le nombre total de cycles ABVD était de 272 . On a eu un seul cas avec une anémie de grade 3 pour laquelle il a eu une transfusion par un CGR.

On a constaté une neutropénie de grade ≥ 3 dans 23,89% avec 10 épisodes de neutropénie fébrile soit dans 3,67% des cycles.

Conclusion

Le but du traitement du LH est de faire une balance entre Toxicité et efficacité.

Les nouvelles recommandations européennes privilégient les cures ABVD par rapport aux BEACOPP avec des résultats similaires.